

コンマ圏


alg-d

http://alg-d.com/math/kan_extension/

2018年4月7日

定義. C_0, C_1, D を圏, $K: C_0 \rightarrow D, L: C_1 \rightarrow D$ を関手とする. 以下のようにして定まる圏をコンマ圏といい, $K \downarrow L$ と書く.

- $K \downarrow L$ の対象は組 $\langle c_0, c_1, f \rangle$ であり以下を満たすものである.
 - (1) c_0 は C_0 の対象である.
 - (2) c_1 は C_1 の対象である.
 - (3) $f: Kc_0 \rightarrow Lc_1$ は D の射である.
- $K \downarrow L$ の射 $\langle c_0, c_1, f \rangle \rightarrow \langle c'_0, c'_1, f' \rangle$ とは組 $\langle g_0, g_1 \rangle$ であり以下を満たすものである.
 - (1) $g_0: c_0 \rightarrow c'_0$ は C_0 の射である.
 - (2) $g_1: c_1 \rightarrow c'_1$ は C_1 の射である.
 - (3) $Lg_1 \circ f = f' \circ Kg_0$, 即ち以下の図式を可換にする.



例 1. $D = C_0 = C, C_1 = \mathbf{1} = \{*\}$ として $K: C \rightarrow C$ を恒等関手 $\text{id}_C, L: \mathbf{1} \rightarrow C$ を $L(*) = c$ で定まる関手とすれば, コンマ圏 $K \downarrow L$ はスライス圏 C/c である. \square

例 2. $D := \mathbf{1}$ として, $K: C_0 \rightarrow \mathbf{1}, L: C_1 \rightarrow \mathbf{1}$ を一意に定まる関手とすれば, コンマ圏 $K \downarrow L$ は圏の直積 $C_0 \times C_1$ である. \square

例 3. 圏 C について $\text{id}_C \downarrow \text{id}_C$ は arrow category となる. 即ち $\text{id}_C \downarrow \text{id}_C = C^2$. \square

例 4. C を圏として $P \in \widehat{C}$ を取る. P を関手 $\mathbf{1} \rightarrow \widehat{C}$ と見なしたとき, コンマ圏 $y \downarrow P$ を P の要素の圏 (category of elements) という. 記号では $\text{el}(P)$, $\int_C P$ などで表すことがある.

コンマ圏 $y \downarrow P$ の対象は, 対象 $c \in C$, $*$ $\in \mathbf{1}$ と自然変換 $\theta: y(c) \Rightarrow P$ の三つ組であるが, 米田の補題から $\theta: y(c) \Rightarrow P$ は元 $x \in Pc$ と同一視することができる. よって $\text{Ob}(y \downarrow P) = \{\langle c, x \rangle \mid c \in \text{Ob}(C), x \in Pc\}$ とみなすことが出来る. 射 $\langle c, x \rangle \rightarrow \langle c', x' \rangle$ は $f: c \rightarrow c'$ で $Pf(x') = x$ となるものである.

関手 $1: \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{Set}$ を $1(*) := 1$ で定める. コンマ圏 $1 \downarrow P$ の対象は $*$ $\in \mathbf{1}$, $c \in C^{\text{op}}$, $f: * \rightarrow Pc$ の三つ組であるから $\text{Ob}(1 \downarrow P) = \{\langle c, x \rangle \mid c \in \text{Ob}(C), x \in Pc\} = \text{Ob}(y \downarrow P)$ とみなせる. 一方で射 $\langle c, x \rangle \rightarrow \langle c', x' \rangle$ は C^{op} の射 $f: c \rightarrow c'$, 即ち C の射 $f: c' \rightarrow c$ で $Pf(x) = x'$ となるものである. 従って $(1 \downarrow P)^{\text{op}} = y \downarrow P$ となることが分かる. \square

命題 5. $(K \downarrow L)^{\text{op}} = L^{\text{op}} \downarrow K^{\text{op}}$ である.

証明. $(K \downarrow L)^{\text{op}}$ の射 $\langle c_0, c_1, f \rangle \rightarrow \langle c'_0, c'_1, f' \rangle$ とは $\langle g_0, g_1 \rangle$ であって次を可換にするものである.

$$\begin{array}{ccccc} c_0 & & Kc_0 & \xrightarrow{f} & Lc_1 & & c_1 \\ g_0 \uparrow & & \uparrow K g_0 & & \uparrow L g_1 & & \uparrow g_1 \\ c'_0 & & Kc'_0 & \xrightarrow{f'} & Lc'_1 & & c'_1 \end{array}$$

一方 $L^{\text{op}} \downarrow K^{\text{op}}$ の射 $\langle c_1, c_0, f \rangle \rightarrow \langle c'_1, c'_0, f' \rangle$ とは $\langle g_1, g_0 \rangle$ であって次を可換にするものである.

$$\begin{array}{ccccc} c_1 & & Lc_1 & \xleftarrow{f} & Kc_0 & & c_0 \\ g_1 \uparrow & & \uparrow L g_1 & & \uparrow K g_0 & & \uparrow g_0 \\ c'_1 & & Lc'_1 & \xleftarrow{f'} & Kc'_0 & & c'_0 \end{array}$$

よって $(K \downarrow L)^{\text{op}} = L^{\text{op}} \downarrow K^{\text{op}}$ が分かる. \square

C_0, C_1, D を圏, $K: C_0 \rightarrow D$, $L: C_1 \rightarrow D$ を関手とする. コンマ圏 $K \downarrow L$ を考えると, 関手 $P_0: K \downarrow L \rightarrow C_0$, $P_1: K \downarrow L \rightarrow C_1$ と自然変換 $\theta: K \circ P_0 \Rightarrow L \circ P_1$ が以下のよ

うに定まる.

$$\begin{array}{ccc}
 C_1 & \xrightarrow{L} & D \\
 P_1 \uparrow & \nearrow \theta & \uparrow K \\
 K \downarrow L & \xrightarrow{P_0} & C_0
 \end{array}$$

- $\langle c_0, c_1, f \rangle \in \text{Ob}(K \downarrow L)$ に対して $P_0 \langle c_0, c_1, f \rangle := c_0$, $\langle g_0, g_1 \rangle \in \text{Mor}(K \downarrow L)$ に対して $P_0 \langle g_0, g_1 \rangle := g_0$.
- $\langle c_0, c_1, f \rangle \in \text{Ob}(K \downarrow L)$ に対して $P_1 \langle c_0, c_1, f \rangle := c_1$, $\langle g_0, g_1 \rangle \in \text{Mor}(K \downarrow L)$ に対して $P_1 \langle g_0, g_1 \rangle := g_1$.
- $\langle c_0, c_1, f \rangle \in \text{Ob}(K \downarrow L)$ に対して $\theta_{\langle c_0, c_1, f \rangle} := f$.

コンマ圏の重要な性質は, この $\langle K \downarrow L, P_0, P_1, \theta \rangle$ がある種の普遍性を持つ事である.

命題 6. C_0, C_1, D を圏, $K: C_0 \rightarrow D$, $L: C_1 \rightarrow D$ を関手として, 上記のように関手 $P_0: K \downarrow L \rightarrow C_0$, $P_1: K \downarrow L \rightarrow C_1$ と自然変換 $\theta: K \circ P_0 \Rightarrow L \circ P_1$ を定める. このとき, 別の組 $\langle E, Q_0, Q_1, \eta \rangle$ が同じ条件, 即ち

- E は圏である.
- $Q_0: E \rightarrow C_0$ は関手である.
- $Q_1: E \rightarrow C_1$ は関手である.
- $\eta: K \circ Q_0 \Rightarrow L \circ Q_1$ は自然変換である.

$$\begin{array}{ccc}
 C_1 & \xrightarrow{L} & D \\
 Q_1 \uparrow & \nearrow \eta & \uparrow K \\
 E & \xrightarrow{Q_0} & C_0
 \end{array}$$

を満たすならば, 関手 $H: E \rightarrow K \downarrow L$ が一意に存在して以下を満たす.

- (1) $P_0 \circ H = Q_0$, $P_1 \circ H = Q_1$ である.

